

Meningitis Viral

U. Epidemiología, SEREMI de Salud

Noviembre 2015


¿Cuándo sospechamos Meningitis Viral?

Signos y síntomas:

- Cefalea intensa
- Fiebre elevada
- Vómitos
- Fotofobia
- **Rigidez de nuca**



Severe headache




Stiff neck



Dislike of
bright lights



Fever/vomiting




Drowsy and less
responsive/
vacant




Rash (develops
anywhere on
body)

Brote de Meningitis Viral 2005 - 2006


Curva Epidémica Meningitis Viral en 7 Regiones de Chile por semana epidemiológica
Agosto 2005 - Febrero 2006



**Meningitis viral, semana 46.
Región Valparaíso. N= 494**





TASA DE MENINGITIS POR COMUNA 2006
SEMANA EPIDEMIOLOGICA 46



Enterovirus – Echovirus 30

Situación actual Región de Valparaíso

- 2015 hasta Semana Epidemiológica 45:
 - Nº casos: 219
 - Letalidad: 0
 - Edad Media: 8 años
(Rango 12 días – 65 años)
 - Mayor incidencia niños 5 – 9
 - Varones: 58.0 %
 - Curso benigno autolimitado
 - Algunos requieren hospitalización
 - Agente causal identificado:
“**Enterovirus Echovirus 30**”



Situación actual Región de Valparaíso

- **2015 hasta Semana Epidemiológica 45:**

Distribución:

- 33,8 % en la Comuna de Viña del Mar
- 26,9% en la Comuna de Valparaíso
- 20 de 38 Comunas en la región han reportado casos de meningitis viral

Comuna	N°	Dist. %
Valparaíso	59	26,9
Casablanca	19	8,7
San Antonio	4	1,8
Algarrobo	4	1,8
Viña del Mar	74	33,8
Con Con	9	4,1
Puchuncavi	3	1,4
Quilpue	9	4,1
Quintero	3	1,4
Villa Alemana	9	4,1
Quillota	7	3,2
Calera	1	0,5
La Ligua	2	0,9
Zapallar	3	1,4
La Calera	3	1,4
Hijuelas	1	0,5
La Cruz	2	0,9
Limache	2	0,9
San Felipe	3	1,4
Los Andes	2	0,9
Total	219	100,0

Definición de caso Meningitis Viral

Paciente que consulta por cuadro agudo de cefalea intensa, fiebre y vómitos, acompañado o no por signos meníngeos. “Examen de LCR con perfil compatible con infección viral”.

Medidas de Prevención y Control

- Lavado frecuente de manos
- Beba siempre agua potable
- Consuma solo verduras cocidas
- Mantenga limpia su cocina
- Limpie con cloro los baños y letrinas
- No comparta los alimentos una vez mordidos
- No compartir cubiertos o vasos
- Mantenga la basura en tarros tapados
- Desinfectar con solución de cloro objetos y superficie.



Medidas de Prevención y Control

- Lavado frecuente de manos
- Limpie con cloro los baños y letrinas
- Desinfectar con solución de cloro objetos y superficies.
- Mantenga la basura en tarros tapados



En resumen

- Enfermedad autolimitada de evolución benigna.
- Producida por enterovirus (echovirus 30), diseminación fecal – oral, siendo muy fácil su transmisión en salas cunas, jardines infantiles y colegios.

Recomendaciones:

- Consulta oportuna
- Condiciones sanitarias
- Hábitos de higiene personal