

## ***¿Qué cuidados debo tener luego de administrada la vacuna?***

-Consumir abundante líquido

-Aplicar paños fríos en caso de dolor o signos de inflamación en sitio de punción

-Si aparece fiebre, desabrigue al niño/a y aplique paños tibios en la frente, abdomen, zona inguinal, y extremidades. En caso de continuar la fiebre, administre paracetamol de acuerdo a la dosis recomendada por su pediatra

<b><i>Tipo de Vacuna</i></b>	<b><i>Curso en que se administra</i></b>	<b><i>Enfermedades de las cuales protegen</i></b>	<b><i>Reacciones locales post vacuna</i></b>	<b><i>Reacciones generales post vacuna</i></b>
Vacuna Tres Vírica	1° básico	Sarampión, rubéola y parotiditis (paperas).	En el sitio en que es administrada la vacuna puede presentar dolor, calor, inflamación o enrojecimiento.	❖ Entre los 5 y 12 días después de administrada la vacuna puede haber fiebre moderada (menor de 39 °C), inflamación de ganglios, catarro y pintas rosadas en la piel.
Vacuna dpTa	1° básico y 8° básico	Difteria, tétanos y pertussis (tos convulsiva o coqueluche)		❖ Podría presentarse cansancio, dolor de cabeza, fiebre moderada y malestar general
Vacuna VPH	4°, 5° básico	Cáncer de cuello uterino, Verrugas genitales, Papilomatosis Respiratoria Recurrente.		❖ Las reacciones adversas posteriores a la administración de esta vacuna son similares a las que provocan otras vacunas que se administran en Chile, estas son dolor e inflamación en el sitio de la inyección.